

Criterios médicos de eficacia para o uso de métodos anticonceptivos. Organización Mundial da Saúde, 2015. 5ª edición

| Método | % de mulleres que quedan embarazadas durante o primeiro ano de uso | | % de mulleres que seguén co método despois de un ano |
|---|--|---------------------------|--|
| | Uso típico ¹ | Uso perfecto ² | |
| Ningún método | 85 | 85 | - |
| Preservativo | | | |
| -masculino | 18 | 2 | 43 |
| -feminino | 21 | 5 | 41 |
| Diafragma | 12 | 6 | 57 |
| Pílula (combinada ou de só xestáxenos) | 9 | 0.3 | 67 |
| Parche | 9 | 0.3 | 67 |
| Anel | 9 | 0.3 | 67 |
| Inyectable intramuscular | 6 | 0.2 | 56 |
| Implante | 0.05 | 0.05 | 84 |
| DIU | | | |
| -cobre | 0.8 | 0.6 | 78 |
| -Jaydess ^{3®} | 0.4 | 0.4 | 81 |
| -Mirena [®] | 0.2 | 0.2 | 80 |
| Esterilización masculina | 0.15 | 0.10 | 100 |
| Esterilización feminina | 0.5 | 0.5 | 100 |
| Esponxa vaxinal | - | - | 36 |
| Con partos vaxinais previos | 24 | 20 | - |
| Sen partos vaxinais previos | 12 | 9 | - |
| Espermicida | 28 | 18 | 42 |
| Métodos naturais | 24 | - | 47 |
| -dos días fixos | - | 5 | - |
| -dos dous días | - | 4 | - |
| - da ovulación (moco cervical) | - | 3 | - |
| -sintotérmico | - | 0.4 | |
| Coito interrompido (marcha atrás) | 22 | 4 | 46 |

Fonte: Trussell J. Contraceptive efficacy. In: Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, Cates W, Kowal D, Polycar M, editors.

Contraceptive technology: twentieth revised edition. New York (NY): Ardent Media; 2011.

³Nelson A, Apter D, Hauck B, Schmelter T, Rybowski S, Rosen K, and Gemzell-Danielsson K. Two low-dose levonorgestrel intrauterine contraceptive systems: a randomized controlled trial. Obstet.Gynecol. 2013; 122(6):1205-1213.

¹Uso típico: efectividade observada na poboación xeral.

²Uso perfecto: efectividade observada cando se emprega sempre o método anticonceptivo, de forma correcta e sistemática.